

| Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 18 juin 2023, 24 espèces |   |                               | Commune : L'Etang-la-Ville                       | MEN : 2214D |   |
|---|---|-------------------------------|--|-------------|---|
| N° CD   | Espèce  | Nom français                  | Synonyme   | Habitat     | Remarques   |
| <b>MYXOMYCETES</b>  |   |                               |  |             |   |
| 0,1   | <i>Fuligo septica</i> (L.)Wiggers                             | Suie putréfiée                |  |             |   |
| <b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>                                  |   |                               |  |             |   |
| <b>Classe : Sordariomycetes</b>                             |   |                               |  |             |   |
| 4,2   | <i>Jackrogersella multiformis</i> (Fries) L. Wendt, Kuhner    | Hypoxylon multiforme          | <i>Hypoxylon multiforme</i>                      | bouleau     |   |
| 5   | <i>Daldinia concentrica</i> (Bolton : Fr.) Cesati & De Notari | Daldinie concentrique         |  |             |   |
| <b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>                               |   |                               |  |             |   |
| <b>Classe : Homobasidiomycetes</b>                          |   |                               |  |             |   |
| <b>Sous-classe : <i>Aphylophoromycetideae</i></b>           |   |                               |  |             |   |
| 66,5  | <i>Stereum insignitum</i> Quélet                              | Stérée remarquable            |  |             | ou subtomentosum                                    |
| 82,5  | <i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.                  | Polypore soufré               |  |             |   |
| 89  | <i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.                          | Amadouvier                    |  |             |   |
| 90  | <i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx               | Polypore marginé              | <i>Ungulina marginata</i>                        | peuplier    |   |
| 90,6  | <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter           | Tramète rougissante           | <i>Trametes rubescens</i>                        |             |   |
| 95  | <i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát                      | Tramète versicolore           |  |             | sec   |
| 95,2  | <i>Trametes gibbosa</i> (Pers.:Fr.)Fr.                        | Tramète bossue                |  | hêtre       | sec   |
| 102   | <i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.                          | Schizophylle commune          |  |             | sec   |
| <b>Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i></b>               |   |                               |  |             |   |
| <b>Ordre : Tricholomatales</b>                              |   |                               |  |             |   |
| 520   | <i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray                       | Collybie à pied en fuseau     | <i>Collybia fusipes</i>                          | chataignier |   |
| 497,5   | <i>Marasmius bulliardii</i> Quélet                            | Marasme de Bulliard           |  |             |   |
| <b>Ordre : Agaricales</b>                                   |   |                               |  |             |   |
| 764   | <i>Coprinellus disseminatus</i> (Persoon) J.E. Lange          | Coprin disséminé              | <i>Coprinus disseminatus</i>                     |             |   |
| 803   | <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire                 | Psathyrelle de De Candolle    |  |             |   |
| <b>Ordre : Amanitales</b>                                   |   |                               |  |             |   |
| 842   | <i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray                  | Amanite rougissante, Golmotte |  |             |   |
| <b>Ordre : Russulales</b>                                   |   |                               |  |             |   |
| 1412  | <i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.                      | Russule à lames fourchues     |  |             | de couleur olive-brune                              |
| 1443  | <i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay                       | Russule brun violacé          |  |             |   |
| 1476  | <i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára                     | Russule rouge cuivre          |  |             |   |
| 1490  | <i>Russula pseudointegra</i> Arnoult & Goris                  | Russule coccinée              |  |             | Gaiac nul sur le pied, ++ sur les lames, Pied creux |
| 1511  | <i>Lactifluus glaucescens</i> (Crossland) Verbeken            | Lactaire verdissant, Lactai   | <i>Lactarius glaucescens</i> , <i>L. pergami</i> |             | Chair verdissante                                   |
| <b>Ordre : Boletales</b>                                    |   |                               |  |             |   |
| 1668  | <i>Tylopilus felleus</i> (Bull.:Fr.)Karsten                   | Bolet amer, Chicotin          |  |             | très amer, réseau peu visible.                      |
| 1681  | <i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn                | Bolet à pied rouge            | <i>Boletus erythropus</i>                        |             |   |
| 1706  | <i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšik          | Bolet rude des charmes        | <i>Leccinum carpini</i>                          |             |   |