

Forêt de Bois-d'Arcy, 8 octobre 2023		51 espèces	Commune : Bois-d'Arcy	MEN : 2214D	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée	<i>Naematelia aurantia</i>		
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae					
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de bœuf		chêne	
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne		châtaignier	
90,7	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard) Bondartsev & Singer	Lenzite tricolore	<i>D. confragosa</i> var. <i>tricolor</i> , <i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilat	Tramète versicolore			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bulliard) Gillot & Lucand	Tricholome jaune et brun	<i>T. flavobrunneum</i>	bouleau	
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i>		
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
525	<i>Gymnopus erythropus</i> (Persoon) Antonín, Halling & Noordeloo	Collybie à pied rouge	<i>Collybia kuehneriana</i>		
533	<i>Gymnopus confluens</i> (Persoon) Zawadzki	Collybie en touffes	<i>Collybia confluens</i> , <i>Marasmiellus c.</i>		
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p.</i>		
629	<i>Hymenopellis radicata</i> (Rehhan) R.H. Petersen	Collybie radicante	<i>Oudemansiella radicata</i>		
Ordre : Agaricales					
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>Psalliota flavescens</i>		
759	<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	Coprin plissé	<i>Coprinus plicatilis</i>		
769	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. John	Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
774,5	<i>Coprinopsis acuminata</i> (Romagnesi) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin noir d'encre pointu	<i>Coprinus acuminatus</i>		
776	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fries) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinus lagopus</i>		
782	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bulliard) Patouillard	Lacrymaire velouté	<i>Psathyrella lacrymabunda</i>		
Ordre : Amanitales					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Pluté couleur de cerf			
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Pluté de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
890	<i>Pluteus romellii</i> (Britz.)Saccardo	Pluté de Romell		Au sol sur bois enterré	Pied jaune pâle, chair jaune dans le pied
Ordre : Cortinariales					
1001	<i>Hebeloma sacchariolum</i> Quélet	Hébélome à odeur sucrée			Odeur de fleur d'oranger, Spores 10,5-15 x 6,5-7 µm Q 1,65-2, saveur amarscente
1019	<i>Inosperma maculatum</i> (Boudier) Matheny & Esteve-Raventós	Inocybe tâcheté	<i>Inocybe maculata</i>		Spores 10-11 x 6-6,5 µm en haricot de profil, pas de cystides métuloïdes
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
Ordre : Russulales					
1360,5	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour			Saveur très piquante, Gaïac nul
1361	<i>Russula sororia</i> (Fr.)Romell	Russule soeur			Saveur très piquante, Gaïac bleu vif
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose		chêne	
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule bleu-vert			Pruine sur chapeau
1437	<i>Russula odorata</i> Romagnesi	Russule odorante			Petite russule, Odeur de pomme, saveur douce, lames jaunes
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule écrevisse des chênes			FeSO4 vert
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
Ordre : Boletales					
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoisi	<i>Pulveroboletus cramesinus</i>		Pores jaune d'or éclatant
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			Pores jaunes
1655	<i>Xerocomellus porosporus</i> (Imler ex Watling) Šutara	Bolet fissuré	<i>Xerocomus p.</i>		Pores bleuissant, chair du pied rougeâtre
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1662	<i>Caloboletus radicans</i> (Persoon) Vizzini	Bolet radican	<i>Boletus radicans</i> , <i>B. albidus</i>		
1667	<i>Butyriboletus fusciorereus</i> (Smott.) Vizzini & Gelardi	Bolet faux royal	<i>Boletus pseudoregius</i>		Chapeau rose, pores bleuissant
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i> , <i>N. luridiformis</i> (LP811 mais non valid.)		
1707	<i>Leccinellum crocipodium</i> (Letellier) Della Maggiora & Trassinelli	Bolet craquelé	<i>Leccinum crocipodium</i>	chêne	
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
Sous-classe : Gasteromycetideae					
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Persoon	Scléroderme commun			
1727	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb.	Scléroderme aréolé			